

新規 申請日: 29 年 8 月 30 日
 変更

レジメン登録申請書

がん(癌)種: 大腸・直腸癌

申請診療科: 外科 申請医師: 嘉悦 勉 内線:

レジメン 2: 大腸4CRC - FOLFIRI + Cet

化学療法委員会医師: 嘉悦 勉 内線:

| | No | 薬品名 | 規格 | 投与量 | 投与ルート 手技 | 点滴時間 速度 | day | day | day | day | day | day | day | day | day | day | |
|---------------|---------------|---------|--------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | (1) | (2) | (3) | (8) | () | () | () | () | () | () | |
| 化学療法 (抗癌剤) | 3 | アービタックス | 100mg | 400mg/m ² | CV port | 2hr | ○ | × | × | × | ※ 1クール目のみ | | | | | | |
| | | アービタックス | 100mg | 250mg/m ² | CV port | 1hr | × | × | × | ○ | | | | | | | |
| | 3' | アービタックス | 100mg | 250mg/m ² | CV port | 1hr | ○ | × | × | ○ | ※ 2クール目以降 | | | | | | |
| | 5 | レボホリナート | 25mg | 200mg/m ² | CV port | 2hr | ○ | × | × | × | ※ カンプトとアイソボリンは同時投与 | | | | | | |
| | 7 | 5-FU | 250mg | 400mg/m ² | CV port側管 | 5min | ○ | × | × | × | | | | | | | |
| | 6 | イリノテカン | 100mg | 150mg/m ² | CV port | 90min | ○ | × | × | × | ※ カンプトとアイソボリンは同時投与 | | | | | | |
| | 8 | 5-FU | 250mg | 2400mg/m ² | CV port | 46hr | × | ○ | ⇒ | ※ 23hrずつ2回に分ける | | | | | | | |
| | ※ すべて輸液ポンプを使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助療法 | 1 | ポララミン | 5mg/1A | 5mg | CV port | 5min | ○ | × | × | ○ | | | | | | | |
| | 2 | デカドロン | 1.65mg/0.5ml | 6.6mg | CV port | 15min | ○ | × | × | × | | | | | | | |
| | | グラニセトン注 | 3mg/3ml | 3mg | | | ○ | × | × | × | | | | | | | |

上記で使用する抗癌剤情報

| No | 薬品名 | 規格 | 標準値 | 上限値 | 累積 投与量 |
|----|-----|----|-----|-----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

サマリーコメント(申請理由・趣旨)
 ポララミン採用に伴う変更
 ジェネリック採用に伴う薬剤名変更(アイソボリン・カンプト)
 制吐剤採用変更のため修正

適応外で、倫理委員会・医学研究等の承認を得た場合は資料を添

| | | | | |
|----------|-------|-----|-----|-----|
| 2 週投与 | 0 週休業 | 委員長 | 事務局 | 薬剤部 |
| 1クールの日数: | 14 日 | | | |
| レジメン基準日: | day 1 | | | |

※抗癌剤の標準値と上限値は必ず記入して下さい 注意: 同一処方内容の場合でも投与時間が異なるときは別のNoに記載してください

※単位はmg/m², mg/body, mg/kg

1クールの日数とレジメン基準日は必ず記入して下さい

化学療法委員会 平成 22 年 9 月 2 日作成

新規 申請日: 29 年 8 月 30 日
 変更

化学療法治療計画書(プロトコール)

がん(癌)種: 大腸・直腸癌

実施診療科:

科

実施医師:

内線:

レジメン 2: 大腸4アービタックス+FOLFIRI

クール数:

2 週投与

0 週休薬

身長: cm

1クールの日数: 14 日

体重: kg

患者ID:

患者氏名:

実施部署:

レジメン基準日: day 1

体表面積: m²

| 実施日 | | | | | | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | | |
|-----|----------|--------------|----------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| No | 薬品名 | 規格 | 投与量 | 投与ルート 手技 | 点滴時間 速度 | day (1) | day (2) | day (3) | day (8) | day () | day () | day () | day () | day () | day () | | |
| 1 | ポラミン | 5mg | | CV port | 5min | ○ | × | × | ○ | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | デカドロン | 1.65mg/0.5ml | 6.6mg | CV port | 15min | ○ | × | × | × | | | | | | | | |
| | グラニセトロン注 | 3mg/3ml | 3mg | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | アービタックス | 100mg | 400mg/m ² | CV port | 2hr | ○ | × | × | × | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 500mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アービタックス | 100mg | 250mg/m ² | CV port | 1hr | × | × | × | ○ | ※ 1クール目のみ | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3' | アービタックス | 100mg | 250mg/m ² | CV port | 1hr | ○ | × | × | ○ | ※ 2クール目以降 | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 | 50mL | | CV port | 1クール60min 2クール30min 3クール以降15min | ○ | × | × | × | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | レボホリナート | 25mg | | CV port | 2hr | ○ | × | × | × | ※ イリノテカンとレボホリナートは同時投与 | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | イリノテカン | 100mg | | CV port | 90min | ○ | × | × | × | ※ イリノテカンとレボホリナートは同時投与 | | | | | | | |
| | 5%ブドウ糖 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 5-FU | 250mg | | CV port側管 | 5min | ○ | × | × | × | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 50mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 5-FU | 250mg | | CV port | 23hr × 2セット | × | ○ | ⇒ | | ※ 23hrずつ2回に分ける | | | | | | | |
| | 生理食塩液 | 250mL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 生理食塩液 | 50mL | | CV port | 15分 | × | × | ○ | ○ | ※ すべて輸液ポンプを使用 | | | | | | | |

化学療法(抗癌剤)