② 新 規 □ 森 恵 申請日: 2021 年 7 月 8 日

レジメン登録申請書

がん(癌)種: 膀胱癌	申請診療科:	泌尿器 科	申請医師: 中里 武彦	内線:
-------------	--------	-------	-------------	-----

レジメン名称:GCarbo

化学療法委員会医師: 中里 武彦 内線:

	No	薬品名	規格	投与量	投与ルート 手技	点滴時間 速度	day (1)	day (2~7)	day	day [9~21]	day (22)	day	day	day	day (day	day
		ゲムシタビン注		1000mg/m ²		30分	0	×	0	×	次のクールへ						
		生理食塩液	100mL	※ 100mL	WALLEY	00),											
		※全量が100mLになるよう調節				I											
化.			450mg•														
化学		カルボプラチン注	150mg•	AUC5	点滴注射	1時間	0	×	×	×	次のクールへ						
療法		生理食塩液	250mL	250mL	WW-1/2231				-								
法																	
1																	
(抗 癌																	
剤																	
\vdash	-1	ガニームしロンジ	3mg	3mg			0		×								
		グラニセトロン注 デキサメタゾン注	1.65mg	1	点滴注射	15分		×		×	次のクールへ						
補		生理食塩液	50mL	50mL		1371	0	^	0	^	0,0,7 ,7 ,						
補助療		工程及塩/仪	JUIIL	JUIIL													
療																	
法																	

上記で使用する抗癌剤情報

No	薬品名	規格	標準値	上限値	累積 投与量

サマリーコメント(申請理由・趣旨)

中里医師よりCBDCAについては下記の通り申請。

- ・投与量はAUC5
- ・1時間かけて投与

(膀胱癌診療ガイドラインにおけるEORTC study 30986より増量)

会・医学研究等の承認 を得た場合は資料を添 付してください。

<u>2</u> 週投与1 週休薬	委員長	事務局	薬剤部
1クールの日数:21日			
レジメン基準日: day1			
異なるときは別のNoに記載してください			

※抗癌剤の標準値と上限値は必ず記入して下さい注意:同一処方内容の場合でも投与時間が異なるときは別のNoに記載してください

※単位はmg/m², mg/body, mg/kg

1クールの日数とレジメン基準日は必ず記入して下さい

化学療法委員会 平成 22 年 9 月 2 日作成

□ 新規 申請日: 2021 年 7 月 8 日一 変更 申請日: 2021 年 7 月 8 日化学療法治療計画書(プロトコール)

。☆ 、 がん(癌)種: 膀胱癌			泌尿器 科_	実施医師: 中里	武彦		内線:	
レジメン名称:GCarbo)	クール数:	2 週投与	1 週休薬	身	長:	cm	
			<u>1クール</u> の日数:	21 日	体	重:	kg	
患者ID:	患者氏名:		レジメン基準日:	day 1	体表面	面積:	m [*]	

	-						<u> </u>					<u> </u>			<u>Д</u>		
			実力	 色日			月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	I 月	日月日	月 日
	No	薬品名	規格	投与量	投与ルート 手技	点滴時間 速度	day [1]	day [_2~7_]	day [8]	day (9~21)	day] [22]	day	day	day	day	day	day] []
	1	グラニセトロン注	3mg	3mg			0		×								
		デキサメタゾン注	1.65mg	6.6mg	点滴注射	15分	0	×	0	×	次のクールへ						
		生理食塩液	50mL	50mL													
			1000mg•														
	2	ゲムシタビン注	200mg	1000mg/m ²		30分	0	×	0	×	次のクールへ						
		生理食塩液		<u></u>													_
			※全量が	100mL(こ)	なるよう調節 												_
	2	 カルボプラチン注	450mg •	AUC5													
	3	生理食塩液	150mg· 250mL	250mL	点滴注射	1時間	0	×	×	×	次のクールへ						+
١.,		工程及温水	ZOOIIIL	ZOOTIL													
化学療	4	生理食塩液	50mL	50mL	点滴注射	5分	0	×	0	×	次のクールへ						
療																	
法									E∆ 7%	 				π	ᅔᇝᇨᆂᄼ		
抗											CCr<60m			_			
抓											ょ育候能 が推奨さ		りかで	个及囚士	・かんかい	症例には	
剤											ル・班头C 寮ガイドラ		10年版	口木沁	は民央が	学会	
\ \times									(1)25	かいだ ロシカ		-				rチェ 催実性 B)	
											CC		こり」玉し2	· , — L , .	У У (0) н		
									 奏効率、OSともにシスプラチン・ベースのレジメンがカルボプラチ								
									ン・ベ	ニスのし	ノジメンよ	りも優れ	ていた。				
									毒性	に関して	は、GCと	GCarbol:	こ差はな	い。			
									シスプラチンfit患者に対してはカルボプラチンではなく、シスプラ チン・ベースのレジメンが推奨される。								
									(膀胱癌診療ガイドライン 2019年版 日本泌尿器科学会 VI.StageIV膀胱癌の治療 総論)								